

Ulcus pepticum: nicotinezuur en analoge

87

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Lehmann E et al. Drug monitoring study (phase IV) of xanthinolnicotinate (Complamin) in general practice. Pharmacopsychiatry 1993;26:42-8.	studie n=10134	10134 patiënten behandeld met xanthinolnicotinaat (1-3 g/dag), zijn gevolgd in een observatiestudie. Er zijn 334 cases (3,3%) met gastro-intestinale klachten gerapporteerd, waarvan bij 3 patiënten ziekenhuisopname noodzakelijk was (gastroenteritis, ulcus en gastrointestinale bloeding).
ref. 2 McQueen EG. The patient with haematuria. N Z Med J 1993;106:211.	brief	Acipimox is gecontra-indiceerd bij ulcus pepticum.
ref. 3 Registratiedossier (deel IB) Olbetam (acipimox) 21-11-03.		<u>CI</u> : Ulcus pepticum.
ref. 4 Registratiedossier (deel IB) Niaspan (nicotinezuur) 09-04-04.		<u>CI</u> : actieve peptische ulcera.
ref. 5 Registratiedossier (deel IB) Complamin (xanthinolnicotinaat) 18-08-00.		<u>CI</u> : actieve maagzweer.

Opmerkingen:

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	24-06-2004

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 24-06-2004: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks dat in de registratiedossiers van acipimox, nicotinezuur, xanthinolnicotinaat ulcus als contra-indicatie wordt genoemd, kan dit niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur.
-----------	--