

Depressie: clonidine

95

Bron	Bewijs	Effect
Postgraduate Med Journal 1993;69:327.	casus	Bij een patiënte (87 jaar, geen psychiatrische voorgeschiedenis) trad na 18 jaar clonidine (2 x daags 0,3 mg) milde depressie op. Direct na staken van de medicatie verbeterde de stemming. Bij gebruik van clonidine als antihypertensivum is de prevalentie van depressie als bijwerking ongeveer 1%. Mechanisme wordt mogelijk toegeschreven aan afname van het vrijkomen van noradrenaline in het CZS.
IB-tekst, Catapresan (clonidine) (23-06-04).		<u>Waarschuwing</u> : gelet op de bijwerkingen voorzichtig bij patiënten met (een voorgeschiedenis van) depressie.

Opmerkingen:

- Geen recente literatuur gevonden (IDIS, Pubmed).

Risicofactoren	Chronische ziekten, langdurig corticosteroïdgebruik, hormonale stoornissen, geneesmiddelaafhankelijkheid en abstinentie, stemmingstoornissen in familie anamnese (besluit projectgroep).
Incidentie	1% (als antihypertensivum).

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	07-10-2005

Actie Balie	Bij eerste uitgifte: overleg met de apotheker. Anders: lever af. Adviseer de patiënt om bij optreden of verergeren van depressieve klachten contact op te nemen met de voorschrijver.
Actie Apotheker	Adviseer de voorschrijver om een ander antihypertensivum voor te schrijven.
Actie Voorschrijver	Idem.
Actie Ziekenhuisapotheek	Idem.

Literatuur

- Prasad A et al. Depression and chronic clonidine therapy. Postgraduate Med Journal 1993;69:327.
- IB-tekst Catapresan.