

Schildklieraandoening: sympathicomimetica

101

Struma: vergroting van de schildklier, ziekte van Graves: auto-immuunziekte gepaard gaande met hyperthyreoïdie.

Bron	Bewijs	Effect
IB-tekst, Berotec (fenoterol) (23-06-04) e.a.* ¹		<u>Cl</u> : thyreotoxicose, hyperthyreoïdie of terughoudendheid is geboden bij hyperthyreoïdie.
IB-tekst, Epipen (epinefrine) (28-04-03) e.a.* ²		<u>Waarschuwing</u> : het geneesmiddel dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij hyperthyreoïdie.
IB-tekst, Norepinefrine CF (20-02-92).		<u>Bw</u> : zwelling van de schildklier is waargenomen bij een aantal patienten.

*¹ Gutron (midodrine) (01-05-04),

*² Efedrine PCH (16-03-92), Isoprenaline (23-02-93), Monofree Fenylefrine (01-09-05), Foradil (formoterol) (15-07-03), Oxis (formoterol) (14-01-03), Symbicort (formoterol) (28-04-04), Ritodrine CF (31-05-96), Ventolin (salbutamol) (13-10-05), Airomir (salbutamol) (12-01-04), Combivent (salbutamol) (05-11-04), Serevent (salmeterol) (14-05-04), Seretide (salmeterol) (25-10-04), Bricanyl (terbutaline) (15-11-01).

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed).
- IB-teksten Dobutamine, Dynatra geven geen informatie.
- Projectgroep: alleen orale en parenterale toediening zouden problemen kunnen veroorzaken, inhalatiepreparaten niet. Bovendien zijn alleen onbehandelde schildklierpatiënten gevoeliger voor het effect van sympathicomimetica, bij euthyreoidie zal geen effect optreden.

Risicofactoren	Struma, ziekte van Graves, auto-immuun thyreoïditis (projectgroep).
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	12-02-2006

Actie Balie	Bij eerste uitgifte: vraag de patiënt of de schildklierfunctie stabiel is. Zo nee: overleg met de apotheker. Anders: lever het middel af.
Actie Apotheker	Bij euthyreoidie: geen actie. Bij onbehandelde schildklierproblemen of bij opbouw schildkliermedicatie: adviseer de voorschrijver om een alternatief voor te schrijven. Indien een alternatief niet mogelijk is: Bij chronische medicatie: adviseer de voorschrijver de schildklierfunctie regelmatig te controleren: voorafgaand aan de behandeling, na 3 of 6 maanden, vervolgens elke 12 maanden. Bij medicatie in de acute situatie: adviseer de voorschrijver de schildklierfunctie extra te controleren. Adviseer om bij optreden of verergeren van hyperthyreoïdie zo nodig de schildkliermedicatie aan te passen.
Actie Voorschrijver	Idem.
Actie Ziekenhuisapothek	Idem.

Literatuur:

- IB-teksten Epipen, Norepinefrine CF, Berotec, Gutron, Efedrine PCH, Isoprenaline, Monofree Fenylefrine, Foradil, Oxis, Symbicort, Ritodrine CF, Ventolin, Airomir, Combivent, Serevent, Seretide, Bricanyl.