

G6PD-deficiëntie: colchicine

210

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Banodkar DD et al. Colchicine as a novel therapeutic agent in chronic bullous dermatosis of childhood. <i>Int J Dermatol</i> 1997;36:213-6.	studie n=6	6 G6PD-deficiënte kinderen (3-9 jaar) met "chronic bullous dermatosis of childhood" (CBDC) werden behandeld met 1 mg/dag colchicine gedurende 4-14 maanden. Niemand ontwikkelde hemolyse.
ref. 2 Chan TK et al. Drug-induced haemolysis in glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. <i>Br Med J</i> 1976;2:1227-9.	studie n=2	Rode bloedcellen afkomstig van 2 type II G6PD-deficiënte personen (Canton variant) werden gelabeld met radioactief natriumchromaat en getransfuseerd in 2 gezonde vrijwilligers. Na 5-10 dagen werd colchicine 1,5 mg/dag toegediend gedurende 7-10 dagen. De $t_{1/2}$ van de gelabelde G6PD-deficiënte rode bloedcellen werd bepaald. Colchicine verkortte de $t_{1/2}$ van de G6PD-deficiënte rode bloedcellen niet.
ref. 3 Beutler E, G6PD deficiency. <i>Blood</i> 1994;84:3613-36.	review	Colchicine kan in therapeutische dosis veilig gebruikt worden bij patiënten met G6PD-deficiëntie zonder niet-sferocyttaire hemolytische anemie (type II/III).
ref. 4 Registratiedossier (deel IB) Colchicine PCH 04-06-04.		<u>Waarschuwing:</u> Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met bloedbeeldafwijkingen.

Opmerkingen:

- Projectgroep: Hoewel Beutler aangeeft, dat colchicine in therapeutische doses veilig gebruikt kan worden bij G6PD-deficiëntie zonder chronische anemie, besluit de werkgroep om toch te waarschuwen voor symptomen van hemolytische anemie, omdat er bij aanwezigheid van additionele risicofactoren mogelijk toch hemolytische anemie op kan treden.
- Prevalentie G6PD-deficiëntie: ca. 400 miljoen mensen wereldwijd. Type II en type III zijn met name hoog bij bevolkingsgroepen oorspronkelijk afkomstig uit Afrika, Azië, het Middellandse gebied of het Midden-Oosten. Type I-deficiëntie is zeldzaam.
- De reviews *Guchelaar HJ. Pharm Sel* 1996;12:62-5 en *Cisci G. Pharm Weekbl* 2004;139:872-8 zijn niet in het statusrapport opgenomen, omdat deze zijn gebaseerd op de review *Beutler, 1994*.

Risicofactoren	koorts, infecties, prenatale periode (zwangere G6PD-deficiënte vrouwen), neonatale periode, eten van tuinbonen, mogelijk gebruik van henna
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen			26 juni 2007
G6PD-deficiëntie zonder chronische anemie (type II/III):	Ja	Ja	
G6PD-deficiëntie met chronische anemie (type I):	Ja	Ja	

G6PD-deficiëntie zonder chronische anemie (type II/III):

Actie Balie	- Lever af en adviseer de patiënt om in het zeer zeldzame geval van optreden van vermoeidheid, duizeligheid, bleekheid, gele huid, donkere verkleuring van de urine of kortademigheid contact op te nemen met de voorschrijver.
Actie Apotheker	- Lever af en adviseer de patiënt om in het zeer zeldzame geval van optreden van vermoeidheid, duizeligheid, bleekheid, gele huid, donkere verkleuring van de urine of kortademigheid contact op te nemen met de voorschrijver.
Actie Voorschrijver	- Adviseer de patiënt om in het zeer zeldzame geval van optreden van vermoeidheid, duizeligheid, bleekheid, gele huid, donkere verkleuring van de urine of kortademigheid contact op te nemen.

Actie Ziekenhuisapothek	Idem als apotheker.
-------------------------	---------------------

G6PD-deficiëntie met chronische anemie (type I):

Actie Balie	- Bij eerste uitgifte: overleg met de apotheker - Bij vervolgitgifte: lever af en adviseer de patiënt om bij optreden van vermoeidheid, duizeligheid, bleekheid, gele huid, donkere verkleuring van de urine of kortademigheid contact op te nemen met de voorschrijver.
Actie Apotheker	- Attendeer de voorschrijver op het mogelijk optreden van een acute hemolyse en verergering van anemie en adviseer de voorschrijver om, indien mogelijk, een alternatief voor te schrijven volgens de vigerende richtlijnen. - Indien alternatief niet mogelijk is: lever af en adviseer de patiënt om bij optreden van vermoeidheid, duizeligheid, bleekheid, gele huid, donkere verkleuring van de urine of kortademigheid contact op te nemen met de voorschrijver.
Actie Voorschrijver	- Schrijf een alternatief voor volgens de vigerende richtlijnen. - Indien alternatief niet mogelijk is: adviseer de patiënt om bij optreden van vermoeidheid, duizeligheid, bleekheid, gele huid, donkere verkleuring van de urine of kortademigheid contact op te nemen.
Actie Ziekenhuisapothek	Idem als apotheker.