

Jicht: levodopa

0441

Bron	Bewijs	Effect
-	-	-

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed).
- Registratiedossier (deel IB) Madopar (levodopa/benserazide) 14-02-02 geeft geen informatie.
- Vermeld in boek Medicatiebegeleiding (KNMP 1990): "Uit enkele publicaties komt naar voren dat tijdens behandeling met levodopa, al dan niet in combinatie met een decarboxylaseremmer, een stijging van de uraatspiegel mogelijk is, die met jichtverschijnselen gepaard kan gaan. Uit deze meldingen blijkt dat hyperurikemische reacties op levodopa goed onder controle zijn te brengen door een jichtmiddel toe te voegen."

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	09-03-2006

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 09-03-2006: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks de melding dat levodopa stijging van de serumurinezuurconcentratie kan veroorzaken, kan de contra-indicatie jicht bij levodopa niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur.
-----------	---