

# Schildklierfunctiestoornis: opioïden

465

Myxoedeem: aandoening t.g.v. hypothyreoïdie.

Bron	Bewijs	Effect
IB-tekst, Sevredol (morfine) (18-10-04) e.a.*		<u>Waarschuwing</u> : zoals bij alle opioïde analgetica dient de dosering van het opiaat te worden verlaagd bij hypothyreoïdie. Voorzichtigheid geboden bij onbehandeld myxoedeem.
IB-tekst, Pethidine (15-08-94).		<u>CI</u> : hypothyreoïdie en myxoedeem. (Het toedienen van pethidine kan leiden tot het ontstaan van een comateuze toestand).
IB-tekst, Dipidolor (piritramide) (08-02-01).		<u>CI</u> : hypothyreoïdie en myxoedeem. (Het toedienen van pethidine kan leiden tot het ontstaan van een comateuze toestand), hyperthyreoïdie.

\*e.a. Rapifen (alfentanyl) (08-02-04), Durogesic (fentanyl) (21-02-05), Palface (dextromoramide) (12-08-03), Palladon (hydromorfon) (28-07-04), Symoron (methadon) (01-09-05), MorZet (nicomorfine) (24-10-89), Oxycontin (oxycodon) (20-11-03), Fortral (pentazocine) (07-11-03), Sufenta (sulfentanil) (08-12-99).

## Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed).
- IB-teksten Temgesic (buprenorfine), Codeine PCH, Depronol (dextropropoxyfeen), Ultiva (remifentanyl) en Tramal (tramadol) geven geen informatie.
- Projectgroep: bij hypothyreoïdie is de kans op ademhalingsdepressie vergroot, echter, dit is alleen te verwachten bij patiënten met onbehandeld myxoedeem, hetgeen zelden meer voor voorkomt.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

Beslissing deskundigen	Contra-indicatie	Actie	Datum
	Nee	Nee	23-03-2005

Raadpleeg	<p>Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 23-03-2005: dit is GEEN contra-indicatie.</p> <p>Bij hypothyreoïdie is de kans op ademhalingsdepressie vergroot, echter, dit is alleen te verwachten bij patiënten met onbehandeld myxoedeem, hetgeen zelden meer voor voorkomt.</p>
-----------	--

## Literatuur

- IB-teksten Rapifen, Durogesic, Palface, Palladon, Symoron, Sevredol, MorZet, Oxycontin, Fortral, Pethidine, Dipidolor, Sufenta.

Geneesmiddelen	Wel/ niet koppelen	Huidige groep	Niveau	Vervallen
Alfentanil, buprenorfine, dextromoramide, dextropropoxyfeen, fentanyl, hydromorfon, , methadon, morfine, nalbufine, nicomorfine, oxycodon, pentazocine, pethidine, piritramide, remifentanil, sufentanil.	Ja	Ja, opioïde analgetica	Omzetten naar SNK	Bezitramide, butorfanol, ethylmorfine, diamorfine, levacetylmethasol, nalbufine, opiumconcentraat.
codeine	Ja	Ja	Omzetten naar SNK	

## 270 tekst

Besluit van de projectgroep: dit is GEEN contra-indicatie. Bij hypothyreoïdie is de kans op ademhalingsdepressie vergroot, echter, dit is alleen te verwachten bij patienten met onbehandeld myxoedeem, hetgeen zelden meer voor voorkomt.