

Schildklieraandoening: cumarinederivaten

474

Bron	Bewijs	Effect

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed, IB-tekst).
- Vermeld in boek medicatiebegeleiding: "Hypothyreoïdie is in verband gebracht met een afgenomen synthese van factor VIII en een toegenomen fibrinolytische activiteit. Bij hyperthyreoïdie is synthese van factor VIII toegenomen. De werking van cumarinederivaten wordt door levothyroxine sterk gepotentieerd (hyperthyreoïdie versnelt de afbraak van vitamine-K afhankelijke stollingsfactoren). Bij afwijkende schildklierfunctie zullen dus frequentere controle (protrombinetijd, Thrombotest) vereist zijn en zo nodig aanpassing van de dosis der cumarinederivaten".
- Projectgroep: dit is een interactie en worden via het interactiebestand bewaakt. (Cumarines en thyreomimetica: zie interactie 2380, cumarine en thyreostatica: zie interactie 2992).

Risicofactoren	-
incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	23-03-2005

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 23-03-2005: dit is GEEN contra-indicatie. Omdat de werking van cumarinederivaten door thyreomimetica kan worden versterkt en door thyreostatica kan verminderen wordt dit niet als contra-indicatie beschouwd, maar als interactie met thyreomimetica of thyreostatica.
-----------	---