

Epilepsie: indometacine

496

Bron	Bewijs	Effect
Allergy 1999;54:90-1.	casus	Een patiënt (man, 65 jaar) kreeg een epileptische aanval 15 minuten na inname van 50 mg indometacine. Na opnieuw opzettelijk indometacine gebruik trad weer een aanval op. Er waren geen lichamelijke afwijkingen te vinden (o.a. normale EEG). De patiënt gebruikte vervolgens regelmatig 500 mg acetylsalicylzuur. Na 2 jaar traden dezelfde soort convulsies op 10 minuten na inname van acetylsalicylzuur. Het mechanisme heeft mogelijk met de tromboxaan- en prostaglandineconcentraties in de hersenen te maken.
IB-tekst, Indocid (08-11-01).		<u>Waarschuwing:</u> Voorzichtig toepassen bij epilepsie aangezien deze aandoening kan verergeren. <u>Bw:</u> convulsies.

Opmerkingen:

- Vermeld in boek Medicatiebegeleiding (KNMP 1990): "indometacine kan in uitzonderingsgevallen tot convulsies leiden".
- Projectgroep: het bewijs is minimaal, maar er bestaat een risico. Er zijn voldoende alternatieven voor indometacine.

Risicofactoren	Psychische aandoeningen in de anamnese (projectgroep).
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	03-06-2005

Actie Balie	Overleg met de apotheker.
Actie Apotheker	Adviseer de voorschrijver om een alternatief voor te schrijven.
Actie Voorschrijver	Idem.
Actie Ziekenhuisapothek	Idem.

Literatuur

- Sanchez-Hernandez MC et al. Seizures induced by NSAID. Allergy 1999;54:90-1.
- IB-tekst Indocid.