

# Epilepsie: amantadine

507

| Bron                            | Bewijs | Effect                                                                                                      |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drugs & Aging 1995;7:38-48.     | review | De incidentie van epilepsieaanvallen door amantadine ter preventie van influenza-A-virus bij ouderen is 3%. |
| IB tekst, Symmetrel (17-06-01). |        | CI: Refractaire epilepsie. (refractaire = ongevoelig voor medicatie).                                       |

## Opmerkingen:

- Vermeld in boek Medicatiebegeleiding (KNMP 1990): "convulsies behoren tot de goed gedocumenteerde centrale bijwerkingen van amantadine en de kans hierop zou bij doseringen hoger dan 200 mg per dag duidelijk toenemen".
- Projectgroep: wordt niet meer gebruikt bij het huidige influenza preventie beleid.

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Risicofactoren | Psychische aandoeningen in de anamnese (projectgroep). |
| Incidentie     | -                                                      |

|                        | Contra-indicatie | Actie | Datum      |
|------------------------|------------------|-------|------------|
| Beslissing deskundigen | Ja               | Ja    | 03-06-2005 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actie Balie             | Overleg met de apotheker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actie Apotheker         | Adviseer de voorschrijver een alternatief voor te schrijven. Indien een alternatief niet mogelijk is: adviseer om de amantadinedosis op te bouwen (bij parkinson: dosering per week verhogen) en om de dosis zo laag mogelijk te houden (maximaal 200 mg per dag). Adviseer de patiënt om bij toename van de aanvalsfrequentie contact op te nemen met de voorschrijver of neuroloog. |
| Actie Voorschrijver     | Idem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actie Ziekenhuisapothek | Idem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Literatuur

- Franson KL et al. Drug-induced seizures in the elderly. Drugs & Aging 1995;7:38-48.
- IB tekst Symmetrel.