

Depressie: anti-emetische dopamine-antagonisten

546

(alizapride, domperidon, metoclopramide, prochlorperazine)

Bron	Bewijs	Effect
Int J Psychiatry Med 1994;24:45-62.	review	Er zijn in de literatuur 4 meldingen bekend over depressie optredend bij het gebruik van metoclopramide.
Am J Geriatr Psychiatry 1997;5:79-82.	casus	Een man (85 jaar, geen psychiatrische voorgeschiedenis) ontwikkelde binnen 2 weken na aanvang van 30 mg metoclopramide parkinsonisme en depressieve kenmerken. Na staken van metoclopramide hielden de depressieve kenmerken aan. Fluoxetine (20 mg) sloeg niet aan. 12 electroconvulsieve therapieën waren nodig om de depressie te genezen. Er zijn 11 casussen van metoclopramide geïnduceerde depressie bekend.
Lareb-databank (www.lareb.nl) (24-08-05).		2 meldingen van depressie.
IB-tekst, Primperan (metoclopramide) (13-03-03).		Bw: zeer zelden en bij uitzondering kunnen voorkomen: neiging tot depressie.

Opmerkingen:

- IB-teksten Litcan (alizapride), Motillium (domperidon) en Stemetil (prochlorperazine) geven geen informatie.
- Droperidol, haloperidol: zie contra-indicatie: nr 548.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	07-10-2005

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 07-10-2005: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks dat in het registratiedossier van metoclopramide depressie als bijwerking wordt genoemd, kan dit niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur. Metoclopramide kan depressie veroorzaken.
-----------	--

Literatuur

- Patten SB et al. Neuropsychiatric adverse drug reactions: passive reports to Health and Welfare Canada's adverse drug reaction database (1965-present). Int J Psychiatry Med 1994;24:45-62.
- Friend KD, Young RC. Late-onset major depressions with delusion after metoclopramide treatment. Am J Geriatr Psychiatry 1997;5:79-82.
- Ganzini L et al. Drug-induced depression in the aged. What can be done? Drugs Aging 1993;3:147-58.
- IB-tekst Primperan.