

Astma: barbituraten

560

CONCLUSIE

Er is geen onderbouwing voor een contra-indicatie.

PICO

P(atient)	patiënten met astma
I(ntervention)	barbituraat
C(omparison / Control)	placebo
O(utcome)	risico op (verergering) luchtwegklachten

Datum literatuursearch: 26-01-2017

PUBMED

Zoekterm: (barbiturates OR amobarbital OR barbital OR phenobarbital OR methohexital OR primidone OR pentobarbital OR thiopental OR secobarbital) and asthma

OVERIGE

Bron	Effect
ref. 1 SPC fenobarbital Apotex 15-05-2014 e.a.*.	<u>CI</u> : ernstige respiratoire insufficiëntie. <u>Waarschuwingen</u> : terughoudendheid is geboden bij een ernstige respiratoire insufficiëntie.
ref. 2 SPC Brietal (methohexital) 06-08-2007.	<u>Waarschuwingen</u> : ademhalingsdepressie en apnoe kunnen voorkomen door verschillen in de tolerantie van patiënten onderling of de lichamelijke conditie van de patiënt. Methohexitalnatrium met de uiterste terughoudendheid gebruiken bij status asthmaticus. <u>Bw</u> : frequentie niet bekend: respiratoire depressie inclusief apnoe, bronchospasmus.
ref. 3 SPC Pentothal (thiopental) 07-12-2009.	<u>CI</u> : status asthmaticus <u>Waarschuwingen</u> : bij patiënten met respiratoire functiestoornissen dient Pentothal met de uiterste voorzichtigheid te worden toegediend. <u>Bw</u> : frequentie niet bekend: bronchospasmen komen voor; zij verdwijnen meestal bij het dieper worden van de anesthesie. Dosisafhankelijk treedt ademhalingsdepressie op.

* SPC Mysoline (primidon) 12-12-2016.

RISICOFACTOREN EN INCIDENTIE

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	11 mei 2017