

Mictieklachten met urineretentie (voorheen Prostaathyperplasie): lisdiuretica

714

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Ozturk B et al. Effects of forced diuresis achieved by oral hydration and oral diuretic administration on uroflowmetric parameters and clinical waiting time of patients with lower urinary tract symptoms. Urol Int 2003;71:22-5.	studie n=58	Studie naar het effect van geforceerde diurese (orale hydratatie of 20 mg furosemide (oraal)) op uroflow-metrische parameters en klinische wachttijd bij patiënten met onbehandelde benigne prostaathyperplasie. In de groep patiënten met ernstige klachten (gem. 62 jaar) trad bij 4 mannen (20%) acute urineretentie op na inname van furosemide.
ref. 2 Registratiedossier (deel IB) Burinex (bumetanide) 15-12-03.		<u>Waarschuwing</u> : een therapie met diuretica kan reeds bestaande symptomen van urinewegobstructie verergeren (bijv. bij patiënten met prostaathypertrofie).
ref. 3 Registratiedossier (deel IB) Lasix (furosemide) 15-04-95.		<u>Waarschuwing</u> : bij mechanische obstructies in de urinewegen (prostaatlijden), kan retentie van urine tot problemen leiden: in dergelijke gevallen voorzichtig zijn en lager doseren.

Opmerkingen:

Risicofactoren	Hypertensie, diabetes mellitus, leeftijd (projectgroep).
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	09-03-2006
Actie Balie	Bij eerste uitgifte: overleg met de apotheker. Bij vervolgitgifte: lever af en adviseer de patient om bij klachten van acute urineretentie (niet kunnen plassen bij een gevulde blaas, in combinatie met aandrang en pijn) contact op te nemen met de voorschrijver.		
Actie Apotheker	Lever af en adviseer de patient om bij acute mictieklachten contact op te nemen met de voorschrijver. Bij optreden mictieklachten: adviseer de voorschrijver om in overweging te nemen of de behandeling veranderd dient te worden.		
Actie Voorschrijver	Idem.		
Actie Ziekenhuisapothek	Idem.		