

Hartfalen: cisapride

1005

Bron	Bewijs	Effect
Registratiedossier (deel IB) Prepulsid 28-04-04.		CI: hartfalen. <u>Waarschuwing</u>: vanwege het risico op cardiale aritmieën wordt gebruik afgeraden bij voorgeschiedenis van belangrijke hartaandoeningen zoals hartfalen etc. Voorafgaand en tijdens het gebruik van cisapride een ECG maken en laboratoriumgegevens controleren.

Opmerkingen:

- Besluit werkgroep KNMP/SHB 15-11-2017: nee/nee-bewaking handhaven.
- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed).

Risicofactoren	Hypertensie, coronaire hartziekten, ritme- of geleidingsstoornissen, klepgebreken, COPD, anemie, schildklierfunctiestoornissen, diabetes mellitus, overgewicht (NHG-standaard Hartfalen 2005).
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	15-11-2017

Raadpleegtekst	Beslissing projectgroep: Dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks dat in het registratiedossier van cisapride hartfalen als contra-indicatie wordt genoemd, kan dit niet worden onderbouwd met literatuur. De contra-indicatie in het registratiedossier is gebaseerd op verlenging van het QTc-interval, waarbij hartfalen een risicofactor is voor verhoging van het risico op torsade de pointes. De projectgroep Verlengd QTc-interval heeft besloten alleen te bewaken op QTc-verlengende middelen bij verlengd QTc-interval en niet bij risicofactoren hierop. Literatuur -Registratiedossier (deel IB) Prepulsid.
----------------	--