

Refluxziekte: calciumantagonisten

1208

Bron	Bewijs	Effect
Pharm Weekbl 1996;131:1340.	casus	Geneesmiddelen die de druk van de onderste slokdarmsfincter verminderen, kunnen refluxklachten luxeren of verergeren. Een voorbeeld hiervan zijn de calciumantagonisten. In overleg met de huisarts moet worden gekeken of de medicijnen die de klachten veroorzaken kunnen worden gestaakt. Additionele leef- en voedingsadviezen zijn ook van belang.
Pharm Weekbl 2000;135:1641-4.	review	Geneesmiddelen kunnen een rol spelen bij het induceren of verergeren van gastro-oesofageale refluxziekte. Calciumantagonisten worden o.a. als voorbeeld genoemd. De voorschrijver en apotheker dienen hierop alert te zijn.

Opmerkingen:

IB-teksten nifedipine, nicardipine, verapamil geven geen informatie.

Co-morbiditeit	Hiatus hernia.
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	ja	ja	24-06-04

Actie Balie	Adviseer de patiënt contact op te nemen met de arts bij terugkeren of verergeren van de refluxklachten.
Actie Apotheker	Adviseer de patiënt contact op te nemen bij terugkeren of verergeren van de refluxklachten. In dat geval dient de dosering van het middel dat gebruikt wordt bij de refluxklachten verhoogd te worden.
Actie Voorschrijver	Adviseer de patiënt contact op te nemen bij terugkeren of verergeren van de refluxklachten. Verhoog in dat geval de dosering van het middel dat gebruikt wordt bij de refluxklachten.
Actie Ziekenhuisapotheek	Adviseer de patiënt contact op te nemen bij terugkeren of verergeren van de refluxklachten. In dat geval dient de dosering van het middel dat gebruikt wordt bij de refluxklachten verhoogd te worden.