

Refluxziekte: theofylline

1214

Bron	Bewijs	Effect
Lancet 1985;2:328-9.	casus	Een patiënt krijgt pijn in de slokdarm na het gebruik van theofylline. Een gastro-intestinale endoscopie toont een oesofagale ulcus aan. Na 20 dagen zijn de symptomen verdwenen. De endoscopie toont aan dat de mucosa weer normaal is.
Drug Safety 2000;22:237-49.	review	Meer dan 70 geneesmiddelen zijn in verband gebracht met geneesmiddel induceerde oesofagitis. Theofylline wordt ook genoemd.
J Clin Gastroenterol 1999;28:298-305.	review	Er zijn 7 cases bekend van geneesmiddel geïnduceerde oesofagitis veroorzaakt door theofylline. Het risico is te verkleinen door de patiënt goed te instrueren en het middel te staken bij klachten.
Pharm Weekbl 2000;135:1641-4.	review	Geneesmiddelen kunnen een rol spelen bij het induceren of verergeren van gastro-oesofageale refluxziekte. Theofylline wordt o.a. als voorbeeld genoemd. De voorschrijver en apotheker dienen hierop alert te zijn.
IB-tekst, Euphyllong (16-02-04).		<u>BW</u> : een verlaagde spiertonus in de onderste oesofagale sfincter kan een bestaande nachtelijke gastro-oesofageale reflux verergeren.

Opmerkingen:

Theofylline kan de zuurproductie verhogen, maar de klinische relevantie hiervan is niet bekend.

co-morbiditeit	Hiatus hernia.
Incidentie	onbekend

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	24-06-04
Actie Balie	Adviseer de patiënt contact op te nemen met de arts bij terugkeren of verergeren van de refluxklachten.		
Actie Apotheker	Adviseer de patiënt contact op te nemen bij terugkeren of verergeren van de refluxklachten. In dat geval dient de dosering van het middel dat gebruikt wordt bij de refluxklachten verhoogd te worden.		
Actie Voorschrijver	Adviseer de patiënt contact op te nemen bij terugkeren of verergeren van de refluxklachten. Verhoog in dat geval de dosering van het middel dat gebruikt wordt bij de refluxklachten.		
Actie Ziekenhuisapothek	Adviseer de patiënt contact op te nemen bij terugkeren of verergeren van de refluxklachten. In dat geval dient de dosering van het middel dat gebruikt wordt bij de refluxklachten verhoogd te worden.		