

Refluxziekte: parasympaticolytica

1215

Bron	Bewijs	Effect
Am J Med 1992;92:985-1055.	review	Anticholinergica zijn toegepast bij oesofageale pijn in de borst. Er is geen effectiviteit gebleken. Het zou de reflux erger kunnen maken.
Pharm Weekbl 2000;135:1641-4.	review	Geneesmiddelen met anticholinerge werking of bijwerkingen, kunnen gastro-oesofageale refluxziekte induceren of verergeren.
IB-tekst, Detrusitol, (tolterodine) (23-02-05).		<u>Waarschuwing</u> : dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met gastro-intestinale obstructie.

Opmerkingen:

co-morbiditeit	Hiatus hernia.
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	ja	ja	24-06-04

Actie Balie	Adviseer de patiënt contact op te nemen met de arts bij terugkeren of verergeren van de refluxklachten.
Actie Apotheker	Adviseer de patiënt contact op te nemen bij terugkeren of verergeren van de refluxklachten. In dat geval dient de dosering van het middel dat gebruikt wordt bij de refluxklachten verhoogd te worden.
Actie Voorschrijver	Adviseer de patiënt contact op te nemen bij terugkeren of verergeren van de refluxklachten. Verhoog in dat geval de dosering van het middel dat gebruikt wordt bij de refluxklachten.
Actie Ziekenhuisapotheek	Adviseer de patiënt contact op te nemen bij terugkeren of verergeren van de refluxklachten. In dat geval dient de dosering van het middel dat gebruikt wordt bij de refluxklachten verhoogd te worden.