

Hypertensie: metoclopramide

1266

Bron	Bewijs	Effect
Int J Clin Pharmacol Ther. 1996;34:390-2.	studie n=65	Evaluatie van effect van metoclopramide (eenmalig IV-infuus 7,5 mcg/kg/min ged. 30 min) op de bloeddruk bij hypertensieve (n=13) en normotensieve (20 studenten, 32 atleten) personen. Bij alle deelnemers werd er een bloeddrukdaling waargenomen. Bij vrouwelijke studenten en hypertensiepatiënten was de daling significant (vrouwelijke studenten systole/diastole: 7,6/5,4%, hypertentie: 12,3/7,6%). Het effect trad na 15 min. na aanvang van het infuus op en hield tot 25 na staken van het infuus aan.
IB-tekst, Primperan (28-07-04).		<u>Cl</u> : vastgesteld of vermoeden van feochromocytoom i.v.m. de kans op ernstige hypertensie. <u>Bw</u> : hypotensie.

Opmerkingen:

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	26-08-2005

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 26-08-2005: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks de waarschuwing van hypertensie in het registratiedossier van metoclopramide, kan dit niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur.
-----------	--

Literatuur

- Blanco M. et al. The effect of intravenous metoclopramide on blood pressure in normotensive and hypertensive subjects. Int J Clin Pharmacol Ther. 1996;34:390-2.
- IB-tekst Primperan (28-07-04).