

Hypertensie: modafinil

1272

Bron	Bewijs	Effect
Neurology 1997;49:444-51.	studie n=71	Cross-over studie bij narcolepsiepatiënten. Elke modafinildosering (200 of 400 mg) en de placebo werd gedurende 2 weken toegediend. Er werd geen significant effect op de bloeddruk of hartslag waargenomen bij zowel normotensieve als hypertensieve patiënten.
IB-tekst, Modiodal (29-12-03).		<u>Waarschuwing</u> : uit farmacodynamische studies blijkt dat modafinil de bloeddruk en de hartslag kan verhogen. Aanbevolen wordt de bloeddruk en hartslag regelmatig te controleren bij patiënten met hypertensie en andere cardiovasculaire aandoeningen.

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed).

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	30-11-2005

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 30-11-2005: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks de waarschuwing van bloeddrukverhoging in het registratiedossier, kan dit niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur.
-----------	--

Literatuur

- Broughton RJ et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled crossover trial of modafinil in the treatment of excessive daytime sleepiness in narcolepsy. Neurology 1997;49:444-51.
- IB-tekst Modiodal (29-12-03).