

Hypertensie: nicotine

1273

Bron	Bewijs	Effect
Arch Int Med 1995;155:450-60.	Review	De ganglionische stimulatie van nicotinereceptoren kan hypertensie veroorzaken. In een studie werd een toename van 11/9 mmHg gevonden na het roken van 2 sigaretten (= 3 mg nicotine).
IB-tekst, Nicotinell TTS (nicotine) (05-07-95).		<u>Waarschuwing</u> : met het oog op farmacologische effecten van S-nicotine, en gezien het feit dat er geen ervaring is bij gebruikers die lijden aan ernstige hypertensie, dient nicotine TTS bij deze gebruikers slechts na zorgvuldige afweging van de risico's t.o.v. de voordelen te worden toegepast.

Opmerkingen:

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	30-11-2005
Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 30-11-2005: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks dat er in het registratiedossier een waarschuwing voor patienten met ernstige hypertensie wordt gegeven, kan dit niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur.		

Literatuur

- Grossman E et al. High blood pressure, a side effect of drugs, poisons, and food. Arch Int Med 1995;155:450-60.
- IB-tekst, Nicotinell TTS (05-07-95).