

Depressie: cyproteron

1281

Bron	Bewijs	Effect
Acta Obstet Gynecol Scand 1981;60:399-401.	studie n=23	Vrouwen met hirsutisme krijgen gedurende 6 maanden op dag 5 tot 14 van de cyclus 100 mg cyproteron, gecombineerd op dag 5-25 met 0,05 mg ethinylestradiol. 6 van de 23 patiënten meldden depressie als bijwerking.
Drugs 2003;63:463-92.	review	Depressie wordt als bijwerking waargenomen bij het gebruik van hormonale anticonceptiva met 2 mg cyproteronacetaat als progestagene component. De incidentie is 1-4%. De incidentie bij vrouwen zonder OAC of placebogebruiksters is minstens zo groot.
IB-tekst, Androcur (20-06-97).		<u>Cl</u> : chronische, ernstige depressies. <u>Bw</u> : in het begin van de behandeling kunnen depressieve stemmingen optreden. Deze verschijnselen verdwijnen meestal weer snel.

Opmerkingen:

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	07-10-2005

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 07-10-2005: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks dat in het registratiedossier van cyproteron depressie als contra-indicatie wordt genoemd, kan dit niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur.
-----------	---

Literatuur

- Ylostalo P et al. Cyproterone acetate in the treatment of hirsutism. Acta Obstet Gynecol Scand 1981;60:399-401.
- Raudrant D et al. Progestagens with antiandrogenic properties. Drugs 2003; 63:463-92.
- IB-tekst Androcur (20-06-97).