

Depressie: digoxine

1282

Bron	Bewijs	Effect
J Card Fail 2003;9:4-12.	studie n=589	M.b.v. een vragenlijst (health-related quality of life = HQOL) werd er gekeken naar het effect op de kwaliteit van leven bij digoxinegebruikers (n=298) met hartfalen t.o.v. placebo (n=291). Na zowel 4 als 12 maanden gaf digoxine geen significant verschil in HQOL-score. Het aantal patiënten met depressieve klachten was zowel bij aanvang van de studie als na 4 en 12 maanden gelijk aan de placebogroep.
Int J Psychiatry Med 1994;24:45-62.	review	Meldingen van depressie als bijwerking komen zeer zelden voor (4 meldingen in 30 jaar). Depressieve symptomen komen wel voor bij digitalis intoxicatie.
IB-tekst, Lanoxin (05-06-02).		<u>Bw</u> : depressie.

Opmerkingen:

- Depressie is een symptoom van intoxicatie en wordt niet waargenomen bij therapeutische doseringen.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	07-10-2005

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 07-10-2005: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks dat in het registratiedossier van digoxine depressie als bijwerking wordt genoemd, kan dit niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur. Depressie is een symptoom van intoxicatie en wordt niet waargenomen bij therapeutische doseringen.
-----------	---

Literatuur

- Lader E et al. The Effect of digoxin on the quality of life in patients with heart failure. J Card Fail 2003;9:4-12.
- Patten SB et al. Neuropsychiatric adverse drug reactions: passive reports to health and welfare Canada's adverse drug reaction database (1965-present). Int J Psychiatry Med 1994;24:45-62.
- IB-tekst Lanoxin.