

Schildklieraandoening: ketoconazol

1317

Bron	Bewijs	Effect
Int J Clin Pharmacol Res. 1988;8:485-8.	studie n=15	10 gezonde en 5 hypothyreoïdie patiënten werden behandeld met ketoconazol (oraal 600 mg/dag gedurende 4 weken) om het mogelijk remmend effect van ketoconazol op schildklier te bestuderen. In beide groepen werd geen klinische verandering in schildklierfunctie gevonden.

Opmerkingen:

- IB geeft geen informatie.
- Vermeld in boek medicatiebegeleiding: "ketoconazol is enkele malen in verband gebracht met het ontstaan van hypothyreoïdie. Aangezien hypothyreoïdie ook kan voorkomen in het kader van het zgn. candida-endocrinopathiesyndroom, is het niet zeker of de hypothyreoïdie inderdaad door de ketoconazol is veroorzaakt".

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	23-03-2005

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 23-03-2005: dit is GEEN contra-indicatie. Hypothyreoïdie als contra-indicatie van ketoconazol kan niet worden onderbouwd met beschikbare literatuur.
-----------	--

Literatuur

- De Pedrini P et al. No effect of ketoconazole on thyroid function of normal subjects and hypothyroid patients. Int J Clin Pharmacol Res. 1988;8:485-8.