

Schildklieraandoening: sulfonamiden

1322

Bron	Bewijs	Effect
IB-tekst Bactrimel (sulfamethoxazol/trimetoprim) (13-11-03).		<u>Waarschuwing</u> : voorzichtigheid is geboden bij patiënten met thyroïddysfunctie omdat cotrimoxazol mogelijk de thyroïdhormoon serumconcentraties doet dalen.

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed).
- IB-teksten trimetoprim, sulfadiazine, Lidatrim (sulfametrol) geven geen informatie.
- Vermeld in boek Medicatiebegeleiding: "sulfonamiden remmen in lichte mate het organificatieproces in de schildklier. De gebruikelijke therapeutische doses zijn echter te laag voor een antithyreoid effect van geringe klinische betekenis".
- Projectgroep: deze antibiotica worden kortdurend gebruik.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	23-03-2005

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 23-03-2005: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks dat het registratiedossier van co-trimoxazol een waarschuwing geeft voor mogelijke daling van schildklierhormoon serumconcentraties, kan dit niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur.
-----------	---

Literatuur

- IB-tekst Bactrimel.