

Schildklieraandoening: sulfonylureumderivaten 1323

Bron	Bewijs	Effect

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (IB, IDIS, Pubmed).
- Vermeld in boek medicatiebegeleiding: "Sulfonylureumderivaten remmen in lichte mate het organificatieproces (inbouw van jodide in tyrosine-residuen binnen het thyreoglobulinemolecuul) in de schildklier, maar de gebruikelijke therapeutische doses zijn te laag voor een antithyreoid effect van enige klinische betekenis".

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	23-03-2005

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 23-03-2005: dit is GEEN contra-indicatie. Sulfonylureumderivaten remmen in lichte mate het organificatieproces (inbouw van jodide in tyrosine-residuen binnen het thyreoglobulinemolecuul) in de schildklier, maar de gebruikelijke therapeutische doses zijn te laag voor een antithyreoid effect van enige klinische betekenis.
-----------	---

Literatuur:

- KNMP. Medicatiebegeleiding. Medisch-farmaceutische achtergronden van verantwoord geneesmiddelengebruik. Houten/Deurne: Bohn Stafleu Van Loghum;1990:p105.