

Veneuze trombose: estramustine

1371

DVT: diep veneuze trombose.

Bron	Bewijs	Effect
Cancer 2003;98:1842-8.	studie n=30	5 patiënten (17%) ontwikkelden DVT tijdens estramustine behandeling (dosering: i.v. variërend van 500-1500 mg/m ² /week, co-medicatie: paclitaxel 100 mg/m ² /week, carboplatine max. 1000 mg/4 weken; max. 6 behandelcycli). Het effect was niet afhankelijk van de dosis.
Cancer 2003;97:537-44.	studie n=36	Patiënten kregen 3 doses estramustine 900mg/m ² /dag (dag 1 tot 3) en 1 dosis docetaxel 70mg/m ² (dag 3) elke 21 dagen. Gedurende de studie kwamen 8 keer een DVT en 1 keer een hersenembolie voor bij 7 patiënten over een totaal van 188 behandelcycli (5%). 2 werden geassocieerd met catheterisatie. Na toedienen van trombose-profylaxe (warfarine, acetylsalicylzuur) werd er geen DVT meer gevonden. De DVT worden toegeschreven aan estramustine of aan kanker.
IB-tekst, Estracyt (21-11-03).		Cl: patiënten mogen Estracyt niet gebruiken wanneer zij lijden aan ernstige cardiovasculaire aandoeningen zoals: trombo-embolieën of complicaties gerelateerd aan vloeistofretentie. Waarschuwing: voorzichtigheid is geboden bij anamnese van tromboflebitis, trombose dan wel trombo-embolische aandoeningen, vooral als deze gerelateerd zijn aan oestrogeen-therapie.

Opmerkingen:

- Projectgroep: kanker is ook een mogelijke oorzaak van trombose, het verhoogde risico is dus ofwel gerelateerd aan de ziekte, ofwel aan het geneesmiddel. Een waarschuwing is op zijn plaats en kan ook als geruststelling werken. Kankerpatiënten zijn gespitst op symptomen van kanker maar in dit geval zijn de symptomen gerelateerd aan trombose.

Risicofactoren	Trombose in de familieanamnese, trombofilie, maligniteit, zwangerschap en kraamperiode, immobiliteit, adipositas en roken (projectgroep).
Incidentie	5-17% DVT

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	26-08-2005

Actie Balie	Overleg met de apotheker.
Actie Apotheker	Adviseer de patiënt om bij optreden van pijnlijke zwelling van het been, plotselinge pijn op de borst en kortademigheid direct contact op te nemen met de voorschrijver. Bij optreden van trombose: adviseer de voorschrijver om de behandeling (tijdelijk) te staken.
Actie Voorschrijver	Idem.
Actie Ziekenhuisapotheek	Idem.