

Diabetes mellitus: atosiban

1442

Bron	Bewijs	Effect
Registratiedossier (SPC) Tractocile (03-08-05).		Bw: 1-10%: hyperglykemie.

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed).
- Contact fabrikant (Ferring) 24-05-06: in een studie werd hyperglykemie bij 5% van de patiënten waargenomen t.o.v. ruim 12% bij de controle-groep. Wereldwijd hebben we slechts 3 spontane meldingen in onze database. Er is geen enkele aanwijzing om diabetes als contra-indicatie te zien voor het gebruik van Tractocile. Het deel IB van Tractocile is recentelijk geupdate waarbij meerdere registratie autoriteiten naar de tekst hebben gekeken. Er is geen reden gezien om hyperglykemie elders dan alleen in de bijwerkingensectie te noemen.
Op theoretische gronden is hierover in het verleden wel gespeculeerd. Omdat oxytocine de glucoseopname in met name de vetcellen kan verhogen, zou een oxytocine-antagonist daarom de glucoseconcentratie in het bloed kunnen verhogen. De klinische relevantie hiervan is echter beperkt.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	24-03-2004

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 24-03-2004: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks dat in het registratiedossier van atosiban hyperglykemie als bijwerking wordt genoemd, kan de contra-indicatie diabetes mellitus bij atosiban niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur.
-----------	--