

Hartfalen: plasmavervangingsmiddelen

1505

Datum literatuursearch: 8 maart 2018

CONCLUSIE

Niet bewaken. Er is geen literatuuronderbouwing voor bewaking. Het is denkbaar dat plasmavervangingsmiddelen risico geven op hypervolemie en daarmee aanleiding kunnen geven tot acuut hartfalen. Vanwege de indicatie van deze groep lijkt bewaking echter niet zinvol.

AANVULLENDE OPMERKINGEN

- Projectgroep KNMP 19-11-2004: deze middelen worden alleen in noodgevallen gebruikt, op het moment dat er een volumetekort is. Patiënt wordt tijdens het toedienen continu bewaakt. In deze situatie is het bewaken op deze contra-indicatie niet zinvol.

PICO

P(atient)	Patient met hartfalen
I(ntervention)	Gebruik van plasmavervangingsmiddelen
C(omparison / Control)	Geen gebruik plasmavervangingsmiddelen
O(utcome)	Verergering hartfalen

PUBMED

Zoekterm: "crystalloid solutions"[Supplementary Concept] AND "Heart Failure"[Mesh]
"Colloids"[Pharmacological Action] AND "Heart Failure"[Mesh]

Beide zoektermen geven geen relevante treffers

SPC

Bron	Resultaten/ opmerkingen
SPC Alburex (albumine) 11-12-2104	Waarschuwing Albumine moet voorzichtig worden toegediend in gevallen waarin hypervolemie en de gevolgen ervan, of hemodilutie een bijzonder risico voor de patiënt kunnen inhouden. Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn: - gedecompenseerd hartfalen
SPC Geloplasma (gelatine gemodificeerde) 5-5-2014	Waarschuwingen Voorzichtigheid is geboden bij decompensatio cordis.
SPC Gelofusine (gelatine gemodificeerde) 9-1-2018	Contra-indicatie: Acuut congestief hartfalen
SPC Omiplasma (plasma versbevr) 5-5-2017	Waarschuwing Omniplasma moet met voorzichtigheid gebruikt worden in de volgende omstandigheden: Manifeste of latente decompensatio cordis.

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing	Nee	Nee	4 juni 2018