

Mictieklachten met urineretentie (voorheen Prostaathyperplasie): cyclofosfamide en ifosfamide

1609

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Registratiedossier (deel IB) Endoxan (cyclofosfamide) 13-07-05.		<u>CI</u> : cyclofosfamide mag niet worden gebruikt bij lagere urinewegobstructies.
ref. 2 Registratiedossier (deel IB) Holoxan (ifosfamide) 28-06-05.		<u>Waarschuwing</u> : met een consequente toediening van Uromitexan is het mogelijk de tot dusver therapiebeperkende urotoxische bijwerkingen te voorkomen. De behandeling met Holoxan mag uitsluitend plaatsvinden in combinatie met Uromitexan.

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed).
- Projectgroep:
Het toedienen van cyclofosfamide en ifosfamide gaat altijd gepaard met de toediening van mercapto-ethaansulfonzuur (Mesna, Uromitexan). Hierdoor worden problemen voorkomen.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	
Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 09-03-2006: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks de melding van urotoxische bijwerkingen in de registratiedossiers van cyclofosfamide en ifosfamide, kan de contra-indicatie bij prostaathyperplasie niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur.		