

Mictieklachten met urineretentie (voorheen Prostaathyperplasie):

1610

anticholinerge anti-arrhythmica

disopyramide, kinidine en procaïnamide

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Danziger LH et al. Disopyramide-induced urinary retention. Arch Intern Med 1983;143:1683-6.	casus n=9	1 patiënt had benigne prostaathyperplasie. De patiënten (gem. 69 jaar, premature ventriculaire contracties/ventriculair tachycardie) hadden een gemiddelde serumconcentratie van disopyramide van 3,4 µg/ml (2,1-6,6) wanneer de symptomen van urineretentie optraden. Vijf continueerden de therapie met disopyramide in een lagere dosering (gem. 2,3 µg /ml), waarbij de symptomen verdwenen. Bij 8 patiënten trad urineretentie op en in 1 geval acuut nierfalen t.g.v. disopyramide. De symptomen traden op gem. 5 dagen na start van de therapie.
Registratiedossier (deel IB) Ritmoforine (disopyramide) 18-10-99.		Waarschuwing: door de parasympathicolytische werking bestaat het risico van urineretentie bij patiënten met prostaathypertrofie.

Opmerkingen:

- Registratiedossiers (deel IB) Kinidine PCH 08-12-95 en Pronestyl (procainamide) 05-10-99 geven geen informatie.
- Projectgroep:
Ook alle middelen met een verwaarloosbare tot matige anticholinerge werking dienen gekoppeld te worden. De contra-indicatie is voor deze middelen echter in mindere mate relevant en die middelen kunnen als alternatief worden gekozen voor de middelen met een sterkere anticholinerge werking.

Risicofactoren	Hypertensie, diabetes mellitus, leeftijd (projectgroep).
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	09-03-2006

Actie Balie	Bij eerste uitgifte: overleg met de apotheker. Bij vervolgitgifte: lever af en adviseer de patient om bij klachten van acute urineretentie (niet kunnen plassen bij een gevulde blaas, in combinatie met aandrang en pijn) contact op te nemen met de voorschrijver.
Actie Apotheker	Lever af en adviseer de patient om bij acute mictieklachten contact op te nemen met de voorschrijver. Bij optreden mictieklachten: adviseer de voorschrijver om in overweging te nemen of de behandeling veranderd dient te worden. Als alternatief kan een middel worden gekozen met minder sterke anticholinerge werking. <u>Indeling mate van anticholinerge werking</u> - Matig: disopyramide. - Zwak: kinidine, procaïnamide.
Actie Voorschrijver	Idem.
Actie Ziekenhuisapothek	Idem.