

Mictieklachten met urineretentie (voorheen Prostaathyperplasie): parasymphathicolytische parkinsonmiddelen

1612

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Registratiedossier (deel IB) Akineton (biperideen) 16-12-04		<u>Waarschuwing</u> : bij patiënten met prostaathypertrofie kan de toediening van biperideen tot mictiestoornissen (dosis reduceren), zelden tot urineretentie (antidotum parasymphathicomimeticum) aanleiding geven.
ref. 2 Registratiedossier (deel IB) Tremblex (dexetimide) 20-04-05.		<u>Cl</u> : prostaathypertrofie. <u>Waarschuwing</u> : Terughoudendheid is geboden bij mictiefunctiestoornissen.
ref. 3 Registratiedossier (Bijsluiter), Orfenadrine CF 17-09-04.		<u>Cl</u> : niet gebruiken bij vergrote prostaat. <u>Bw</u> : vasthouden van urine
ref. 4 Registratiedossier (deel IB) Artane (trihexyfenidyl) 21-12-04.		<u>Cl</u> : prostaathypertrofie.

Opmerkingen:

- Projectgroep:
Op theoretische gronden kunnen parasymphathicolytische parkinsonmiddelen urineretentie veroorzaken, vanwege de anticholinerge werking.

Risicofactoren	Hypertensie, diabetes mellitus, leeftijd (projectgroep).
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	09-03-2006

Actie Balie	Bij eerste uitgifte: overleg met de apotheker. Bij vervoluitgifte: lever af en adviseer de patient om bij klachten van acute urineretentie (niet kunnen plassen bij een gevulde blaas, in combinatie met aandrang en pijn) contact op te nemen met de voorschrijver.
Actie Apotheker	Lever af en adviseer de patient om bij acute mictieklachten contact op te nemen met de voorschrijver. Bij optreden mictieklachten: adviseer de voorschrijver om in overweging te nemen of de behandeling veranderd dient te worden. Als alternatief kan een middel worden gekozen met minder sterke anticholinerge werking. <u>Indeling mate van anticholinerge werking</u> - Sterk: biperideen, trihexyfenidyl. - Matig-sterk: dexetimide. - Zwak-matig: orfenadrine.
Actie Voorschrijver	Idem.
Actie Ziekenhuisapothek	Idem.