

Mictieklachten met urineretentie (voorheen Prostaathyperplasie): parasympatholytica, systemisch

1613

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Ji Youl Lee et al. Comparison of doxazosin with or without tolterodine in men with symptomatic bladder outlet obstruction and an overactive bladder. BJU Int. 2004;94:817-20.	studie n=144	Prospectieve studie naar het effect van de combinatie van doxazosine en tolterodine bij patiënten met blaasledigingsstoornissen (BOO) en overactieve blaas (OAB). De mannen (BOO: gem. 63.1 jaar, n=76 en BOO+OAB: gem. 68.5 jaar, n=68) kregen 3 maanden doxazosine (2 of 4 mg/dag). Bij onvoldoende effect (BOO: 21%, BOO+OAB: 65%) werd tolterodine (2 mg 2x daags) toegevoegd voor 2 maanden. Bij twee (3,3%) patiënten ontstond acute urineretentie t.g.v. tolterodine. Katheterisatie was nodig en de urineretentie verdween 24 uur na staken tolterodine.
ref. 2 Registratiedossier (deel IB) Atropine PCH 10-09-92.		<u>CI</u> : prostaathypertrofie.
ref. 3 Registratiedossier (SPC) Emselex (darifenacine) 22-02-05 e.a. *1		<u>CI</u> : urineretentie. <u>Waarschuwing</u> : voorzichtigheid is geboden bij patiënten met klinische significante obstructie van de blaaslediging en risico voor urineretentie.
ref. 4 Registratiedossier (deel IB) Urispas (flavoxaat) 12-03-79.		<u>Bw</u> : retentieverhoging.
ref. 5 Registratiedossier (SPC) Kentera (oxybutynine-pleister) 16-12-05.		<u>CI</u> : Het gebruik van Kentera is gecontra-indiceerd bij patiënten met urineretentie. <u>Waarschuwing</u> : Bij patiënten met een klinisch significante urineweg-obstructie moet het gebruik van anticholinergica met de nodige voorzichtigheid plaatsvinden.
ref. 6 Registratiedossier (deel IB) Dridase (oxybutynine) 11-01-01.		<u>CI</u> : mictiestoornissen ten gevolge van obstructie. <u>Waarschuwing</u> : voorzichtigheid is geboden bij patiënten met prostaathypertrofie. De symptomen van prostaathypertrofie kunnen verslechteren.
ref. 7 Registratiedossier (deel IB) Scopoderm TTS (scopolamine) 08-10-96.		<u>Waarschuwing</u> : voorzichtigheid is geboden bij stoornissen van de urinelozing ten gevolge van obstructie van de urinewegen (bv. bij ziekten van de prostaat).
ref. 8 Registratiedossier (deel IB) Buscopan tabletten en zetpillen (scopolamine-butyl) 05-04-04.		<u>Waarschuwing</u> : Door het potentiële risico van anticholinerge complicaties moet Buscopan met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een verhoogde kans op obstructies van de urinewegen.
ref. 9 Registratiedossier (deel IB) Buscopan injectie (scopolamine-butyl) 05-04-04.		<u>CI</u> : prostaathypertrofie met urineretentie.

*1 Registratiedossiers (deel IB) Vesicare (solifenacine) 02-09-05 en Detrusitol (tolterodine) 23-02-05.

Opmerkingen:

- Projectgroep:
Ook alle middelen met een verwaarloosbare tot matige anticholinerge werking dienen gekoppeld te worden. De contra-indicatie is voor deze middelen echter in mindere mate relevant.

Risicofactoren	Hypertensie, diabetes mellitus, leeftijd (projectgroep).
----------------	--

Incidentie	-
------------	---

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	09-03-2006

Actie Balie	Bij eerste uitgifte: overleg met de apotheker. Bij vervolgitgifte: lever af en adviseer de patient om bij klachten van acute urineretentie (niet kunnen plassen bij een gevulde blaas, in combinatie met aandrang en pijn) contact op te nemen met de voorschrijver.
Actie Apotheker	Lever af en adviseer de patient om bij acute mictieklachten contact op te nemen met de voorschrijver. Bij optreden mictieklachten: adviseer de voorschrijver om in overweging te nemen of de behandeling veranderd dient te worden. Als alternatief kan een middel worden gekozen met minder sterke anticholinerge werking. <u>Indeling mate van anticholinerge werking</u> - Sterk: atropine, belladonnapreparaat, darifenacine, oxybutynine, scopolamine, scopolaminebutyl, solifenacine, tolterodine. - Zwak: flavoxaat.
Actie Voorschrijver	Idem.
Actie Ziekenhuisapotheek	Idem.