

Mictieklachten met urineretentie (voorheen Prostaathyperplasie): pizotifeen 1615

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Registratiedossier (deel IB) Sandomigran (pizotifeen) 06-04-00.		<u>Waarschuwing</u> : voorzichtigheid is geboden bij patiënten met urineretentie bv. bij prostaathypertrofie.

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed),
- Projectgroep:
Op theoretische gronden kan pizotifeen urineretentie veroorzaken, vanwege de anticholinerge werking.

Risicofactoren	Hypertensie, diabetes mellitus, leeftijd (projectgroep).
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	09-03-2006

Actie Balie	Bij eerste uitgifte: overleg met de apotheker. Bij vervolgitgifte: lever af en adviseer de patient om bij klachten van acute urineretentie (niet kunnen plassen bij een gevulde blaas, in combinatie met aandrang en pijn) contact op te nemen met de voorschrijver.
Actie Apotheker	Lever af en adviseer de patient om bij acute mictieklachten contact op te nemen met de voorschrijver. Bij optreden mictieklachten: adviseer de voorschrijver om in overweging te nemen of de behandeling veranderd dient te worden.
Actie Voorschrijver	Idem.
Actie Ziekenhuisapotheek	Idem.