

Nauwe-kamerhoekglaucoom & primair open-kamerhoekglaucoom: pizotifeen

1639

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Registratiedossier (deel IB) Sandomigran 06-04-00.		CI: nauwe-kamerhoek-glaucoom.

Opmerkingen^[JR1]:

- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed) betreffende nauwe-kamerhoekglaucoom.
- Geen literatuur gevonden (IDIS, Pubmed) betreffende primair open-kamerhoekglaucoom.
- Pizotifeen is een serotonine-antagonist en heeft een zwakke anticholinerge werking.
- De waarschuwing is gebaseerd op theoretische gronden^[JR2]:
Vanwege de anticholinerge werking kan mydriasis (pupilverwijding) optreden. Het pupilverwijdend effect kan bij een nauwe kamerhoek tot afsluiting daarvan leiden en zo een acute glaucoomaanval uitlokken.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

Nauwe-kamerhoekglaucoom:

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	13-09-2006

Primair open-kamerhoekglaucoom:

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	13-09-2006

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 13-09-2006: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks dat in het registratiedossier glaucoom als contra-indicatie wordt genoemd, kan dit niet onderbouwd worden met de beschikbare literatuur voor zowel nauwe-kamerhoekglaucoom als primair open-kamerhoekglaucoom. Literatuur: Registratiedossier (deel IB) Sandomigran 06-04-00.
-----------	---