

Myasthenie: 1696

corticosteroïden auriculair, cutaan en per inhalatie

MG = myasthenia gravis

Bron	Bewijs	Effect
-		

Opmerkingen:

- geen literatuur gevonden voor toediening auriculair, cutaan en per inhalatie (IDIS, Pubmed).
- Registratiedossiers (deel IB) Qvar (beclometason) 17-10-05, Betnelan (betamethason) 07-06-05, Pulmicort (budesonide) 20-03-03, Alvesco (ciclesonide) 27-11-06, Dermovate (clobetasol) 01-07-02, Emovate (clobetasol) 21-12-05, Topicorte (desoximetason) 28-08-06, Sofradex (dexamethason/framycetine/gramicidine) 07-07-06, Nerisona (diflucortolon) 19-07-04, Panotile (fludrocortison/dexamethason/lidocaïne/neomycine/polymyxineB) 09-01-92, Locacorten, (flumetason) 28-08-04, Cutivate (fluticason) 05-07-04, Flixotide (fluticason) 05-02-02, Terra-Cortril (hydrocortison/oxytetracycline/polymyxineB) 31-07-06, Elocon (mometason) 17-12-91 en Mycolog (triamcinolonacetonide/gramicidine/neomycine/nystatine) 07-07-06 geven geen informatie.
- voor systemische toediening is een aparte contra-indicatiegroep opgenomen.
- Projectgroep:
Corticosteroïden per inhalatie bij myasthenie-patiënten met astma geeft geen problemen.
Corticosteroïden auriculair of cutaan geven geen problemen.
- De bekendste vorm van Myasthenie is Myasthenia Gravis (MG) en de tweede bekende vorm is het Lambert Eaton Myastheen Syndroom (LEMS).

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	19-10-2006

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 19-10-2006: dit is GEEN contra-indicatie.
-----------	--