

Myasthenie: kinidine, kinine en hydrokinine

1771

MG = myasthenia gravis

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Thanvi BR et al. Update on myasthenia gravis. Postgrad Med J 2004;80: 690-700.	review	Kinine kan myasthene symptomen veroorzaken of spierzwakte in patiënten met MG verergeren.
ref. 2 Kaeser HE. Drug-induced myasthenic syndromes. Acta Neurol Scand 1984;70:39-47.	review	Kinidine en kinine kunnen de symptomen van MG verergeren. En door hun interferentie met de neuromusculaire transmissie kunnen ze spierrelaxatie tijdens anesthesie verdiepen of verlengen.
ref. 3 Registratiedossier (deel IB) Chinini sulfas (kinine) 18-11-99.		<u>Waarschuwing</u> : Voorzichtigheid is geboden bij myasthenia gravis.
ref. 4 Registratiedossier (deel IB) Inhibin (hydrokinine) 07-07-06 e.a.* ¹		<u>CI</u> : Myasthenia gravis.

*¹ Registratiedossier (deel IB) Kinidine PCH 08-12-95.

Opmerkingen:

- Projectgroep:
Kinine is gecontraïndiceerd.
- De bekendste vorm van Myasthenie is Myasthenia Gravis (MG) en de tweede bekende vorm is het Lambert Eaton Myastheen Syndroom (LEMS).

Risicofactoren	(emotionele) stress, systemische ziekten (verkoudheid en infecties), vaccinaties, hypokaliëmie, hypomagnesiëmie, hypo- en hyperthyreoïdie, koorts, operatie, menstruele cyclus, zwangerschap en kraambed. (projectgroep).
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	19-10-2006

Actie Balie	Niet afleveren. Overleg met de apotheker.
Actie Apotheker	Dit geneesmiddel is gecontraïndiceerd bij patiënten met myasthenie. Overleg met de voorschrijver over een alternatief, indien mogelijk.
Actie Voorschrijver	Dit geneesmiddel is gecontraïndiceerd bij patiënten met myasthenie. Schrijf, indien mogelijk, een alternatief voor.
Actie Ziekenhuisapotheek	Idem als apotheker.