

Myasthenie: propafenon

1772

MG = myasthenia gravis

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Wittbrodt ET. Drugs and Myasthenia Gravis – An update. Arch Intern Med 1997;157:399-408.	review	Propafenon, een anti-aritmicum, wordt geclassificeerd als 'mogelijk geassocieerd' met myasthenia gravis. Dit wordt geïllustreerd met de volgende casus. Bij patiënt (68 jaar, oculaire MG) treedt verergering van ptosis en diplopie op en algemene myasthenie symptomen als dysfagie en spierzwakte, na start met propafenon (oraal, dosering wordt niet vermeld). 2 weken later wordt propafenon gestaakt, omdat een pacemaker wordt geïmplant. De patiënt herstelt tot baseline-status. Mogelijk is het beta-blokkerende effect van propafenon de oorzaak van het verergeren van de MG in deze patiënt.
ref. 2 Registratiedossier (deel IB) Rytmonorm (propafenon) 03-07-00.		CI: Myasthenia gravis

Opmerkingen:

- Projectgroep:
Verergering in de casus kan zijn vanwege de beta-blokkerende eigenschappen van propafenon. Eén casus is te weinig onderbouwing, dus hoeft niet te worden gecontraïndiceerd.
- De bekendste vorm van Myasthenie is Myasthenia Gravis (MG) en de tweede bekende vorm is het Lambert Eaton Myasthen Syndroom (LEMS).

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	19-10-2006

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 19-10-2006: dit is GEEN contra-indicatie. Ondanks dat in het registratiedossier myasthenia gravis als contra-indicatie wordt genoemd, kan dit niet onderbouwd worden met de beschikbare literatuur. Literatuur: • Wittbrodt ET. Drugs and Myasthenia Gravis – An update. Arch Intern Med 1997;157:399-408. • Registratiedossier (deel IB) Rytmonorm.
-----------	---