

Myasthenie: corticosteroïden nasaal

1777

MG = myasthenia gravis

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Wittbrodt ET. Drugs and Myasthenia Gravis – An update. Arch Intern Med 1997;157:399-408.	review	Corticosteroïden worden geclassificeerd als 'zeker geassocieerd' met myasthenia gravis. Corticosteroïden kunnen bij langdurig gebruik spierafbraak induceren, wat leidt tot spierzwakte. Bij patiënten met myasthenia gravis leidt het gebruik van corticosteroïden vaak eerst tot kortdurende toename van de spierkracht.
ref. 2 Kaeser HE. Drug-induced myasthenic syndromes. Acta Neurol Scand 1984;70:39-47.	review	Corticosteroïden kunnen de symptomen van MG verergeren.

Opmerkingen:

- Registratiedossiers (deel IB) Beclometason Nevel 29-10-04, Rhinocort (budesonide) 02-03-06, Syntaris (flunisolide) 25-03-04, Flixonase (fluticason) 23-09-04, Nasonex (mometason) 07-09-06 en Nasacort (triamcinolonacetonide) 02-06-06 geven geen informatie.
- Projectgroep:
Nasale toediening van corticosteroïden kan de oogklachten bij een myasthenie verergeren door lokale opname in de circulatie, wat tot een direct effect op de ogen kan leiden. Ook wanneer door verkeerd sprayen het corticosteroïd in het oog komt kunnen de myasthene oogklachten verergeren.
- De bekendste vorm van Myasthenie is Myasthenia Gravis (MG) en de tweede bekende vorm is het Lambert Eaton Myastheen Syndroom (LEMS).

Risicofactoren	(emotionele) stress, systemische ziekten (verkoudheid en infecties), vaccinaties, hypokaliëmie, hypomagnesie, hypo- en hyperthyreoïdie, koorts, temperatuur, operatie, menstruele cyclus, zwangerschap en kraambed. (projectgroep).
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	19-10-2006

Actie Balie	- Lever af en adviseer de patient uit voorzorg om bij verergeren van de myasthene klachten (vnl. dubbelzien en omlaaghangen bovenste ooglid) contact op te nemen met de voorschrijver.
Actie Apotheker	- Lever af en adviseer de patient uit voorzorg om bij verergeren van de myasthene klachten (vnl. dubbelzien en omlaaghangen bovenste ooglid) contact op te nemen met de voorschrijver.
Actie Voorschrijver	- Adviseer de patient uit voorzorg om bij verergeren van de myasthene klachten ((vnl. dubbelzien en omlaaghangen bovenste ooglid) contact op te nemen.
Actie Ziekenhuisapotheek	Idem als Apotheker.