

Myasthenie: corticosteroïden oculair

1778

MG = myasthenia gravis

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Wittbrodt ET. Drugs and Myasthenia Gravis – An update. Arch Intern Med 1997;157:399-408.	review	Corticosteroïden worden geclassificeerd als 'zeker geassocieerd' met myasthenia gravis. Corticosteroïden kunnen bij langdurig gebruik spieraafbraak induceren, wat leidt tot spierzwakte. Bij patiënten met myasthenia gravis leidt het gebruik van corticosteroïden vaak eerst tot kortdurende toename van de spierkracht.
ref. 2 Kaeser HE. Drug-induced myasthenic syndromes. Acta Neurol Scand 1984;70:39-47.	review	Corticosteroïden kunnen de symptomen van MG verergeren.

Opmerkingen:

- Registratiedossiers (deel IB) Dexamethason Monofree (dexamethason) 01-06-06, FML Liquifilm (fluormetholon) 14-03-73, Ultracortenol (prednisolon) 28-02-89 en Vexol (rimexolon) 01-10-96 geven geen informatie.
- Projectgroep:
Oculaire toediening van corticosteroïden kan door een direct effect (oculaire) myasthenie verergeren.
- De bekendste vorm van Myasthenie is Myasthenia Gravis (MG) en de tweede bekende vorm is het Lambert Eaton Myasthen Syndroom (LEMS).

Risicofactoren	(emotionele) stress, systemische ziekten (verkoudheid en infecties), vaccinaties, hypokaliëmie, hypomagnesie, hypo- en hyperthyreoïdie, koorts, temperatuur, operatie, menstruele cyclus, zwangerschap en kraambed. (projectgroep).
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	19-10-2006

Actie Balie	- Attendeer de voorschrijver op het mogelijk verergeren van de myasthene klachten. - Lever af en adviseer de patient om bij verergeren van de myasthene klachten (vnl. dubbelzien en omlaaghangen bovenste ooglid) contact op te nemen met de voorschrijver.
Actie Apotheke	- Attendeer de voorschrijver op het mogelijk verergeren van de myasthene klachten. - Lever af en adviseer de patient om bij verergeren van de myasthene klachten (vnl. dubbelzien en omlaaghangen bovenste ooglid) contact op te nemen met de voorschrijver.
Actie Voorschrijver	- Adviseer de patient om bij verergeren van de myasthene klachten (vnl. dubbelzien en omlaaghangen bovenste ooglid) contact op te nemen.
Actie Ziekenhuisapotheek	Idem als Apotheke.