

G6PD-deficiëntie: fenacetine

1801

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Guchelaar HJ. Glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiëntie als contra-indicatie – welke geneesmiddelen zijn veilig? Pharm Sel 1996; 12:62-5.	review	Fenacetine kan tot een dosis van 3,6 g/dag gegeven worden bij type II en type III G6PD-deficiënties, maar niet bij type I G6PD-deficiëntie.
ref. 2 Beutler E. G6PD deficiency. Blood 1994;84:3613-36.	review	Fenacetine kan in therapeutische dosis veilig gebruikt worden bij patiënten met G6PD-deficiëntie zonder niet-sferocyttaire hemolytische anemie (type II/III).

Opmerkingen:

- Projectgroep: Dit is wel een contra-indicatie, maar wegens de toedieningsvorm wordt tot een nee/nee besloten. Fenacetine wordt alleen gebruikt als hulpstof in oordruppels. Fenacetine is alleen nog als grondstof te verkrijgen.
- De review *Cisci G. Pharm Weekbl 2004;139:872-8* is niet in het statusrapport opgenomen, omdat deze is gebaseerd op de reviews *Beutler, 1994* en *Guchelaar, 1996*.

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen			26 juni 2007
G6PD-deficiëntie zonder chronische anemie (type II/III):	Nee	Nee	
G6PD-deficiëntie met chronische anemie (type I):	Nee	Nee	

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 26-06-2007: dit is GEEN contra-indicatie. Literatuur: • Guchelaar HJ. Glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiëntie als contra-indicatie; welke geneesmiddelen zijn veilig? Pharma Selecta 1996;12:62-5. • Beutler E. G6PD deficiency. Blood 1994;84:3613-36.
-----------	---