

G6PD-deficiëntie: metamizol/propyfenazon

1804

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Cisci G. Niet elke contra-indicatie is een contra-indicatie - G6PD-deficiëntie en acute hemolytische anemie door geneesmiddelen. Pharm Weekbl 2004;139:872-8.	review	Metamizol kan acute hemolyse veroorzaken bij G6PD-deficiëntie (absolute contra-indicatie) (bron: Informatorium Medicamentorum, 2003).
ref. 2 Registratiedossier (deel IB) Novalgin (metamizol) 07-07-06.		<u>Cl</u> : afwijkingen in het bloedbeeld: aangeboren glucose-6-fosfaat-dehydrogenasedeficiëntie.
ref. 3 Registratiedossier (deel IB) Sanalgin (propyfenazon/paracetamol/coffeïne) 08-08-05.		<u>Waarschuwing</u> : Bij patiënten met de zelden voorkomende glucose-6-fosfaat-dehydrogenasedeficiëntie kan door gebruik van producten die propyfenazon bevatten hemolytische anemie optreden.

Opmerkingen:

- Projectgroep: Omdat de enige bewijsvoering een deel IB van het registratiedossier is, besluit de projectgroep dat er onvoldoende bewijs is om metamizol en propyfenazon te contra-indiceren bij G6PD-deficiëntie.

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen			26 juni 2007
G6PD-deficiëntie zonder chronische anemie (type II/III):	Nee	Nee	
G6PD-deficiëntie met chronische anemie (type I):	Nee	Nee	

Raadpleeg	Besluit van de projectgroep Contra-indicaties op 26-06-2007: dit is GEEN contra-indicatie. Literatuur: • Cisci G. Niet elke contra-indicatie is een contra-indicatie - G6PD-deficiëntie en acute hemolytische anemie door geneesmiddelen. Pharm Weekbl 2004;139:872-8. • Registratiedossiers (deel IB) Novalgin en Sanalgin.
-----------	---