

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: difenhydramine

2137 t/m 2140

TGA = Therapeutic Goods Administration

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Schaefer C et al. Drugs during pregnancy and lactation. Treatment options and risk assessment. Londen: Academic Press; 2007. p. 58, 84, 656.	<p><i>zwangerschap:</i> Een groot aantal zwangerschappen met blootstelling aan difenhydramine is onderzocht. Er is geen verhoogd teratogeen risico gevonden. Parenteraal gebruik van difenhydramine aan het einde van de zwangerschap kan contracties stimuleren, wat zou kunnen leiden tot zuurstoftekort bij de baby. Onttrekkingsverschijnselen zijn gemeld na gebruik van difenhydramine gedurende de zwangerschap. Difenhydramine is veilig tijdens het begin van de zwangerschap, maar moeten vermeden worden in het 3^e trimester vanwege het vermogen om baarmoedercontracties te stimuleren.</p> <p><i>borstvoeding:</i> Geen gedetailleerde kennis over de effecten van gebruik van difenhydramine tijdens de borstvoeding.</p>	<p><i>zwangerschap:</i> Difenhydramine is veilig tijdens het begin van de zwangerschap, maar moeten vermeden worden in het 3^e trimester vanwege het vermogen om baarmoedercontracties te stimuleren.</p>
ref. 2 TGA. Prescribing medicines in pregnancy. An Australian categorisation of risk of drug use in pregnancy. Internetsite Therapeutic Goods Administration 2008. Beschikbaar via: http://www.tga.gov.au/docs/html/medpreg.htm . Geraadpleegd 10/07/2008		Categorie A: Geneesmiddelen die door een groot aantal zwangere en vruchtbare vrouwen zijn gebruikt zonder dat een verhoogde incidentie van misvormingen of andere direct of indirect schadelijke effecten op de foetus zijn aangetoond.

Opmerkingen:

- Difenhydramine is een 1^e generatie antihistaminicum. In Nederland is het alleen als grondstof beschikbaar.

	Effect	Actie	Datum
Beslissing WINAp			30 juli 2008
Kinderwens (vrouw)*	onbekend	ja	
Zwangerschap	onbekend	ja	
Borstvoeding	onbekend	ja	
Kinderwens (man)**	onbekend	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man