

Psoriasis: antibacteriële middelen

2464

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Yamamoto T et al. Minocycline-induced acute generalized exanthematous pustulosis in a patient with generalized pustular psoriasis showing elevated level of sELAM-1. Acta Derm Venereol 1997;77:168-9.	casus n=1	Bij patiënte (52 jaar, pustuleuze psoriasis) treedt verergering van de psoriasis op 3 uur na start met minocycline (100 mg/dag), ondanks behandeling van de psoriasis met etretinaat (10 mg/dag). Na staken van de minocycline treedt binnen 10 dagen herstel op van de psoriasis tot als voor de start met minocycline. 5 jaar eerder was dit ook al eens opgetreden ten gevolge van minocycline (200 mg/dag).
ref. 2 Bergner T et al. Psoriasis and tetracyclines. J Am Acad Dermatol 1990;23:770.	casus n=1	Bij patiënte (50 jaar, psoriasis) treedt verergering van de psoriasis op 2-3 weken na start met tetracycline (oraal, 3x daags 500 mg), zonder aanwezigheid van een infectieziekte. Enkele weken na staken van tetracycline zijn de acute laesies bijna geheel verdwenen.
ref. 3 Katz M et al. Penicillin-induced generalized pustular psoriasis. J Am Acad Dermatol 1987;17:918-20.	casus n=1	Bij patiënt (26 jaar, pustuleuze psoriasis) treedt verergering van de psoriasis op 2 uur na inname van amoxicilline (500 mg). Na behandeling met etretinaat (60 mg/dag) treedt binnen 2 dagen flinke verbetering op. De behandeling met etretinaat wordt voortgezet (40 mg/dag). Bij de patiënt was in het verleden al vaker verergering van de psoriasis opgetreden ten gevolge van ampicilline, penicilline en ook amoxicilline.
ref. 4 Tsankov NK et al. Reply on Psoriasis and tetracyclines. J Am Acad Dermatol 1990;23:770-1.	review + casus n=1	De auteurs zijn er van overtuigd dat tetracyclines de ontwikkeling van psoriasis kunnen induceren en bestaande psoriasis kunnen verergeren. Ze verwijzen naar een eerder beschreven casus, waarin bij een patiënte (40 jaar) psoriasis verergerde na therapie met doxycycline (dosering niet vermeld) en na herstart daarvan.
ref. 5 Mulder WMC et al. Stoppen is meestal niet nodig. Pharm Weekbl 2003;138:492-5.	review	Tetracyclines zouden zo mogelijk vermeden moeten worden bij patiënten met psoriasis of een voor psoriasis belaste familieanamnese.

Opmerkingen:

- SPC's Clamoxyl (amoxicilline) 25-10-98, Ampicilline Ratiopharm 04-06-04, Zinacef (cefuroxim) 28-02-01, Co-trimoxazol Forte 08-09-88, Erythrocin (erythromycine) 26-08-05, Floxapen (flucloxacilline) 01-02-04, Gentamicine Baxter 20-09-05, Mycolog (gramicidine/triamcinolonacetonide/nystatine/neomycine) 07-07-06, Neomycine CF 22-06-93, Noroxin (norfloxacin) 05-03-03, Rifadin (rifampicine) 07-07-06, Flammazine (sulfadiazine) 30-06-05 en Tetracycline PCH 24-09-92 geven geen informatie.
- Projectgroep:
Antibacteriële middelen vormen geen contra-indicatie bij psoriasis.
Er zijn maar enkele casus en het kan in die gevallen zo zijn dat de infectie zelf of een Koebner-effect een rol speelt bij de verergering van de psoriasis.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	14-02-2007