

Psoriasis: olanzapine

2477

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Latini A et al. Psoriasis during therapy with olanzapine. Eur J Dermatol 2003;13:404-5.	casus n=2	- Bij patiënt (38 jaar, psoriasis) treedt verergering van de psoriasis op 2 weken na start met olanzapine (oraal, 2dd 5 mg). 2 maanden na staken van olanzapine en start van de behandeling van psoriasis met ciclosporine A (3 mg/kg/dag) zijn de laesies geheel verdwenen. Ciclosporine A werd 1 maand daarna (na afbouwen) gestaakt. 15 dagen na herstart met olanzapine, 6 maanden later, treedt wederom verergering van de psoriasis op. 1 maand na staken van de olanzapine en start van de behandeling van psoriasis met lokaal salicylzuur (2dd 10%) en clobetasol (cutaan, 2dd) treedt weer volledig herstel op. - Bij patiënt (28 jaar, geen psoriasis in anamnese, wel in familiehistorie) ontstaat psoriasis 20 dagen na start met olanzapine (2 dd 5 mg). 1 maand na staken van olanzapine, starten met amitriptyline (2 dd 10 mg) en perfenazine (2 dd 2 mg) en starten van de behandeling van psoriasis met salicylzuur (2 dd 10%) en clobetasol (2 dd) verdwenen de huidlaesies.

Opmerkingen:

- SPC Zyprexa (olanzapine) 13-10-06 geeft geen informatie.
- Projectgroep:
Wegens de zeer geringe onderbouwing besluit de projectgroep dat dit geen contra-indicatie is.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	14-02-2007