

Psoriasis: terbinafine

2481

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Gupta AK et al. Cutaneous adverse effects associated with terbinafine therapy: 10 case reports and a review of the literature. Br J Dermatol 1998;138:529-32.	casus n=10 + review	De auteurs beschrijven 10 casus van ernstige huidafwijkingen die door terbinafine ontstaan zijn; 2 betreffen psoriasis. -Bij patiënt (80 jaar, psoriasis) treedt verergering van de psoriasis op 26 dagen na start met terbinafine (250 mg/dag). Na staken van de terbinafine en na start van de behandeling van de psoriasis met lokale corticosteroïden treedt snel verbetering op. -Bij patiënt (52 jaar, psoriasis) treedt verergering van de psoriasis op 6 dagen na start met terbinafine (2x daags 250 mg). Na staken van de terbinafine en na start van de behandeling van de psoriasis met lokale corticosteroïden treedt snel verbetering op.
ref. 2 Gupta AK et al. Terbinafine therapy may be associated with the development of psoriasis de novo or its exacerbation: four case reports and a review of drug-induced psoriasis. J Am Acad Dermatol 1997;36:858-62.	casus n=4 + review	Terbinafine geeft in 2,7 % van de gebruikers huidreacties. -Bij patiënte (70 jaar, psoriasis) treedt verergering van de psoriasis op 17 dagen na start met terbinafine (250 mg/dag). -Bij patiënt (50 jaar, geen psoriasis in (familie)anamnese psoriasis op 27 dagen na start met terbinafine (250 mg/dag). Na staken van de terbinafine en na start van de behandeling van de psoriasis met corticosteroïden (lokaal en oraal) treedt een minimale verbetering op. Binnen 2 weken na start met methotrexaat treden goede verbeteringen op, waarna de prednison (na afbouwen) gestaakt kan worden. 16 weken na de start met methotrexaat zijn de laesies geheel verdwenen. -Bij patiënte (54 jaar, psoriasis) treedt verergering van de psoriasis op 21 dagen na start met terbinafine (250 mg/dag). 2 weken na staken van terbinafine en behandeling van de psoriasis in een ziekenhuis met zoutcompressen en lokale corticosteroïden treedt verbetering van de psoriasis op. -Bij patiënt (34 jaar, psoriasis) treedt verergering van de psoriasis op 12 dagen na start met terbinafine (250 mg/dag). Ondanks voortzetten gebruik van terbinafine en door behandeling van de psoriasis met lokale corticosteroïden treedt verbetering van de psoriasis op. Latentietijden bij induceren of verergeren van psoriasis: kort (< 4 weken): terbinafine en NSAID's. middellang (4-12 weken): malariamiddelen en RAAS-remmers. lang (>12 weken): lithium en betablokkers.
ref. 3 Kennisdatabank – Belangrijke signalen [database on the internet]. 's Hertogenbosch: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. [cited 2007 jan.]. Skin reactions associated with the use of oral terbinafine. Available from: http://www.lareb.nl/documents/kwb_2004_3_terbi.pdf	review	Rapporten uit de databases van het LAREB en de WHO geven mogelijk verband aan dat terbinafine psoriasis kan veroorzaken of verergeren. De database van het LAREB bevatte 3 meldingen over psoriasis door terbinafine. Halverwege 2004 bevatte de database van de WHO 1 melding over verergering van psoriasis en ook 1 melding over induceren van psoriasis door terbinafine.
ref. 4 Mulder WMC et al. Stoppen is meestal niet nodig. Pharm Weekbl 2003;138: 492-5.	review	Van terbinafine is zowel inductie de novo van psoriasis als verergering van een bestaande psoriasis gemeld.

Opmerkingen:

- SPC Lamisil (terbinafine) 28-02-05 geeft geen informatie.
- Projectgroep:
Verergering van psoriasis treedt zelden op in de praktijk, maar als het optreedt is dat wel in een heftige vorm. Er zijn alternatieven voorhanden voor terbinafine.

Risicofactoren	verwonding/irritatie van de huid (door snijden, verbranden, uitslag, insectenbeten, zonnebrand), virale en bacteriële infecties, overmatig alcoholgebruik, roken, gebrek aan zonlicht en slechte gezondheid.
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	14-02-2007