

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: glucose

2831 t/m 2834

RIVM = Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; TGA = Therapeutic Goods Administration

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 SPC Glucose 70% 12-02-2001.		<i>zwangerschap en borstvoeding</i> Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift in de zwangerschap en tijdens de lactatie worden gebruikt.

Opmerkingen:

- Tijdens de zwangerschap zijn de bloedglucosewaarden instabieler (met name aan het einde van het 1^e trimester) met neiging tot lage nuchtere plasmaglucosewaarden, hoge postprandiale waarden en optreden van nachtelijke hypoglykemie.
- Vrouwen met PDM (type I en II) hebben verhoogd risico op het krijgen van kinderen met congenitale afwijkingen, zoals ruggemerg-, ledemaat- en hartafwijkingen, neurale buisdefecten en afwijkingen van het circulatoire systeem (ref. 1, 2, 3, 4 en PW Wetenschappelijk Platform 2009;3(3):42-8).
- Vrouwen met PDM (type I en II) hebben verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties (hypertensie, pre-eclampsie, vroeggeboorte, macrosomie, neonatale hypoglykemie) en op een keizersnede (ref. 1, 2, 3, 4 en PW Wetenschappelijk Platform 2009;3(3):42-8).

	Effect	Actie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum			4 augustus 2010
Kinderwens (vrouw)*	onbekend	nee	
Zwangerschap	onbekend	nee	
Borstvoeding	onbekend	nee	
Kinderwens (man)**	onbekend	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man