

Astma/COPD: anticholinergica

2926

Bron	Studie	Effect
ref. 1 SPC Atropinesulfaat, oplossing voor injectie 07-04- 05.		<u>Waarschuwing</u> : Atropine moet voorzichtig worden toegepast bij patiënten met chronische pulmonale aandoeningen omdat de afname van de bronchiaal-secretie kan leiden tot de vorming van propfen in de bronchus. <u>Bw</u> : In relatief kleine doses vermindert atropine de uitscheiding van speeksel, zweet en bronchiaalvocht. De verminderde bronchiaalsecretie kan uitdroging van de achtergebleven secretie veroorzaken en kan daardoor leiden tot de vorming van dikke propfen in de bronchi die moeilijk vanuit de longen kunnen worden opgehoest.
ref. 2 SPC Detrusitol (tolterodine) 30- 03-10.		<u>Bw</u> : Vaak ($\geq 1/100$ en $< 1/10$): bronchitis
ref. 3 SPC Emselex (darifenacine) 21-01-10 e.a.*		<u>Bw</u> : Soms: dyspneu, hoest
ref. 4 SPC Cyclogyl (cyclopentolaat) 01-08-05.		<u>Bw</u> : Zeer zelden ($< 0,01\%$): verminderde bronchiale secreties
ref. 5 SPC Spiriva (tiotropium) 12- 04-10.		<u>Indicatie</u> : Tiotropium is geïndiceerd als een bronchusverwijder voor de onderhoudsbehandeling van chronische obstructieve luchtwegaandoeningen (COPD), ter verlichting van symptomen bij patiënten.
ref. 6 SPC Atrovent Inhaletten (ipratropium) 30-03-09.		<u>Indicatie</u> : Atrovent Inhaletten kan als bronchusverwijder worden toegepast bij respiratoire chronische obstructieve luchtwegaandoeningen (verhoogde bronchiale stromingsweerstand), zoals astma bronchiale en bronchopulmonale aandoeningen met een spastische component (bronchitis met emfyseem, chronische spastische bronchitis enz.). Tevens kan Atrovent Inhaletten worden toegepast bij patiënten met astma en een verhoogde adrenerge sensibiliteit, waardoor bèta2-sympathicomimetica niet worden verdragen.

* SPC Toviaz (fesoterodine) 15-06-10.

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (IDIS, PubMed).
- SPC's Urispas (flavoxaat) 25-10-07, Dridase (oxybutynine) 25-10-07, Minims Tropicamide 12-05-10, Scopoderm TTS (scopolamine) 27-03-97, Akineton (biperideen) 10-12-04, Artane (trihexyfenidyl) 27-04-05, Buscopan (butylscopolamine) 21-09-09, Homatropinehydrobromide ratiopharm 12-02-06 en Vesicare (solifenacine) 31-05-10 geven geen informatie.
- Informatorium 2010, inleidende tekst Parasympathicolytica, Bijwerkingen: Door verminderde bronchussecretie kan de achtergebleven secretie uitdrogen, waardoor dikke propfen slijm in de bronchi kunnen ontstaan die moeilijk zijn op te hoesten. Verder kunnen bij inhalatietherapie bronchospasmen optreden.

Datum literatuursearch: 25-06-2010.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	nee	nee	10-01-2011