

| Bron                                                                                              | Studie | Effect                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ref. 1</b><br>SPC Uromitexan<br>(natrium-2-<br>mercapto-<br>ethaan-<br>sulfonaat) 20-7-<br>10. |        | <u>Bw</u> : hoesten, tachypneu.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ref. 2</b><br>SPC Mistabron<br>(mercapto-<br>ethaan-<br>sulfonaat) 18-2-<br>75.                |        | Indicaties: Toegediend met de aërosolmethode is dit geneesmiddel bestemd voor long- en bronchusaandoeningen, waarbij verlaging van de mucoviscositeit noodzakelijk is.<br><u>Bw</u> : Prikkelhoest, mogelijkheid tot bronchospasmen. |

**Opmerkingen:**

- Geen literatuur gevonden (PubMed).
- Projectgroep: er is onvoldoende onderbouwing voor een contra-indicatie.

Datum literatuursearch: 25-6-2010.

|                |  |
|----------------|--|
| Risicofactoren |  |
| Incidentie     |  |

|                        | Contra-indicatie | Actie | Datum      |
|------------------------|------------------|-------|------------|
| Beslissing deskundigen | Nee              | Nee   | 10-01-2011 |