

Depressie: hydroxychloroquine

2970

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Good MI et al. Lethality and behavioral side effects of chloroquine. J Clin Psychopharmacol 1982;2:40-7.	review	In de studie van Drew werden de bijwerkingen van anti-malaria-middelen zoals chloroquinesulfaat, hydroxychloroquine en amodiaquine, bij reumapatiënten beschreven. Hierbij ontwikkelde 62% van de 65 patiënten psychische symptomen bij een dosering van 150-200 mg per dag. Vermoeidheid en depressie waren de eerste en meest voorkomende toxische symptomen.
ref. 2 SPC Plaquenil (hydroxychloroquine) 09-10-2002.		<u>Bw</u> : psychische stoornissen. Duizeligheid, nervositeit en sneller geëmotioneerd zijn. Zelden komt psychose voor.

Opmerkingen:

- Projectgroep: Er is onvoldoende onderbouwing voor een contra-indicatie. In de SPC worden psychische stoornissen genoemd als bijwerking, maar depressie wordt hierbij niet genoemd. In de studie vermeld in referentie 1 wordt hydroxychloroquine alleen samen met chloroquine en amodiaquine bekeken.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	nee	nee	10-01-2011