

Brugada-syndroom: te vermijden geneesmiddelen 3037

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Postema PG et al. Drugs and Brugada syndrome patients: review of the literature, recommendations and an up-to-date website (www.brugadadrugs.org). Heart Rhythm 2009;6:1335-41.	review	Aangeraden wordt de volgende geneesmiddelen te vermijden bij Brugada-patiënten (gerangschikt naar afnemend bewijsniveau): Klasse IIa: amitriptyline, bupivacaïne, clomipramine, cocaïne, nortriptyline, oxcarbazepine, procaïne, propafenon Klasse IIb: cannabis, lithium, propofol De verschillende bewijsniveaus zijn als volgt gedefinieerd: klasse IIa – er is tegenstrijdig bewijs en/of verschil van mening, maar het bewijs en/of de mening voor een pro-aritmisch effect bij Brugadapatiënten weegt zwaarder; klasse IIb – er is tegenstrijdig bewijs en/of verschil van mening. Een potentieel pro-aritmisch effect bij Brugadapatiënten blijkt minder duidelijk uit het beschikbare bewijs en/of de mening van deskundigen

Opmerkingen:

- Op de website www.brugadadrugs.org worden adviezen gegeven m.b.t. bovengenoemde geneesmiddelen. Deze zijn vastgesteld door een internationaal deskundigenpanel (de "BrugadaDrugs.org Advisory Board").
 Voor verschillende geneesmiddelen is in de literatuur een verband gevonden tussen het geneesmiddel en het voor Brugada-syndroom kenmerkende ECG (type 1) of aritmieën bij patiënten met Brugada-syndroom. Het bewijs is in de meeste gevallen van niveau C (consensus onder deskundigen, casus of "standard-of-care") en in sommige gevallen van niveau B (niet-gerandomiseerde studies).

Laatste datum raadpleging www.brugadadrugs.org: 28 april 2014

Risicofactoren	koorts, bradycardie
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	ja	ja	22 mei 2012