

Brugada-syndroom: flecaïnide en procaïnamide 3039

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Postema PG et al. Drugs and Brugada syndrome patients: review of the literature, recommendations and an up-to-date website (www.brugadadrugs.org). Heart Rhythm 2009;6:1335-41.	review	Flecaïnide en procaïnamide worden gebruikt bij het stellen van de diagnose Brugada-syndroom bij patiënten bij wie zonder uitlokking niet het kenmerkende "type-1-Brugada-syndroom-ECG" wordt gevonden. Aangeraden wordt om flecaïnide en procaïnamide te vermijden bij Brugadapatiënten bij gebruik anders dan als diagnosticum (bewijsniveau: klasse I). Bewijsniveau "klasse I" is als volgt gedefinieerd: er is bewijs en/of algemene overeenstemming voor een potentieel pro-arritmisch effect bij Brugadapatiënten.

Opmerkingen:

- Op de website www.brugadadrugs.org worden adviezen gegeven m.b.t. geneesmiddelen. Deze zijn vastgesteld door een internationaal deskundigenpanel (de "BrugadaDrugs.org Advisory Board").
Voor verschillende geneesmiddelen is in de literatuur een verband gevonden tussen het geneesmiddel en het voor Brugada-syndroom kenmerkende ECG (type 1) of aritmieën bij patiënten met Brugada-syndroom. Het bewijs is in de meeste gevallen van niveau C (consensus onder deskundigen, casus of "standard-of-care") en in sommige gevallen van niveau B (niet-gerandomiseerde studies).
- Projectgroep: Procaïnamide staat niet meer in het Informatorium, maar wordt nog off label gebruikt en ook voor andere doeleinden dan diagnose van Brugada-syndroom. Dit middel moet daarom gekoppeld worden.
Ajmaline wordt ook nog off label gebruikt. Dit wordt echter alleen gebruikt als diagnosticum voor Brugada-syndroom en hoeft dus niet gekoppeld te worden.

Laatste datum raadpleging www.brugadadrugs.org: 7 juni 2012

Risicofactoren	koorts, bradycardie
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	ja	ja	22 mei 2012